

دراسة :التوتر يزيد من انتشار الخلايا السرطانية



بالإجهاد النفسي سوف يؤدي بالضرورة إلى تفاقم المرض، وانتشاره بصورة أوسع في جسم المصاب. وقال العلماء الذين أجروا الدراسة إن التوتر النفسي لطالما ظل على ارتباط وثيق بالعديد من الأمراض بما فيها أورام الصدر والبروستات، إلا أن هذا الارتباط ظل طوال الفترة الماضية عبارة عن لغز لم يتمكن الأطباء من تحليله، فيما تعتبر نتائج هذه الدراسة بداية لتفكيك لغز الارتباط بين الخلايا السرطانية في الغار الذي أجريت عليه التجارب. يشار إلى أن سرطان الثدي يعتبر الأوسع انتشارا بين السيدات في العالم، أما سرطان البروستات فهو الأوسع انتشارا بين الرجال في العالم. ويؤدي كل من المرضين الى مئات آلاف الوفيات سنويا في مختلف أنحاء العالم.

أظهرت دراسة طبية جديدة أجريت في أستراليا أن التوتر والإجهاد النفسي يتسبب بانتشار الخلايا السرطانية في جسم المريض، حيث وجد الباحثون أن الضغوط النفسية تؤدي إلى شحن كبير وفائق للأوعية الدموية في الجسم بما يعزز من حركة الخلايا السرطانية ويزيد من انتشار المرض في الجسم. ووجد العلماء أن الهرمونات التي تنتج عن الإجهاد والتوتر النفسي تزيد من الخلايا السرطانية في «النظام اللمفاوي» الذي يقوم بدوره بنقل هذه الخلايا إلى أماكن جديدة، بما يؤدي إلى انتشار المرض في جسم الإنسان. وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد أن أجريت التجارب والفحوص على الفئران، إلا أن العلماء قالوا إن هذه النتائج تمثل اختراقا من شأنه لاحقا تحديد كيفية السيطرة على مرض السرطان، ومن شأنه المساعدة في التوصل إلى علاجات للمرض. وبهذه النتائج يتعين على الأطباء وذوي المرضى مراعاة الحالة النفسية للمصابين بالسرطان، حيث إن هذا البحث يفيد بأن تدهور الحالة النفسية للمريض وشعوره

احتمال وارد، في حين أنه إذا كانت نسبة الكالسيوم الموجودة في جسم الإنسان عالية، فإن الأستاتون تكون قوية وناصعة البياض، ويختلف لون الأستاتون أيضا بنسبة الكالسيوم، حيث أن اللون الأبيض يدل على وجود كالسيوم جيد في جسم الإنسان. يتعرض الجسم للإجهاد، حيث إن نقص الكالسيوم في جسم الإنسان يؤدي إلى ضعف العظام، ومن المحتمل حدوث كسر في الأعضاء التي تتعرض لحادث حتى لو كان بسيطا. يعاني الأشخاص الذين لا يتناولون الكمية الكافية من الكالسيوم خلال اليوم من الأرق، وقلة ساعات النوم وعدم الحصول على النوم الكافي والعميق. هناك بعض المضاعفات التي قد تحدث للإنسان إذا لم يتناول كمية كافية من الكالسيوم خلال اليوم، مثل هشاشة العظام، وتلف العين، واضطرابات في عدد ضربات القلب، ويمكن أن تؤدي إلى الموت. مرض هشاشة العظام وهو مرض يصيب الإنسان الذي يعاني من نقص الكالسيوم، ومن أعراضه صعوبة المشي أو الحركة، كسر في العمود الفقري، العجز. غالبا ما يحدث للنساء، وذلك لأنها تفقد الكثير من الكالسيوم خلال فترة الحمل والرضاعة، ويتم علاجه عن طريق تناول الشخص المصاب لأقراص مكمل للكالسيوم، أو يمكن الإكثار من تناول البيض وشرب الحليب، والإكثار أيضا من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والتي تم ذكرها سابقا.

الحوامل بتناول أقراص مكمل للكالسيوم لمنع حدوث نقص عند الأم وعند الجنين. الأطفال والمراهقين: حيث أنهم في مرحلة نمو سريعة، وبحاجة دائمة للكالسيوم لبناء العظام والأستاتون، ويُنصح الأطفال والمراهقون بتناول البيض وشرب الحليب يوميا عند الإفطار، حيث يساعدهم على النمو السليم. النباتيين: وهم الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على النبات، ولا يتناولون أي نوع من أنواع اللحوم، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والتي أيضا يحتوي البيض منها على الحديد الذي يُحد من امتصاص الكالسيوم لجسم الإنسان، ولذلك تكون نسبة إصابتهم بمرض هشاشة العظام أو نقص الكالسيوم كبيرة ومحتملة. أعراض نقص الكالسيوم تشنج في كفي اليدين والقدمين. تشنج عضلة القدمين وخاصة الساق خلال النوم. آلام في العضلات الإحساس بتشنج القدمين أو كرف البدن والشفة تشنج في القدرات العقلية (وتكون غالبا في الحالات المتقدمة لنقص الكالسيوم) انقطاع مؤقت في النفس (وغالبا ما تكون عند الأطفال الخدج أو المواليد) تشنج الأظافر وجفاف الجلد، حيث إن الأظافر تتأثر بشكل مباشر من نقص الكالسيوم في الجسم، كما أن الجلد والبشرة تجف وخاصة الوجه ضعف الإنسان أو تسوسها: حيث إن نسبة الكالسيوم في جسم الإنسان تؤثر على الأسنان، فإذا كانت قليلة فإن احتمال وقوع الأسنان أو تسوسها

الذي يتناوله الإنسان خلال يومه. لا يُنصح بعلاج نقص الكالسيوم عن طريق أخذ مكملات أو أقراص الكالسيوم دون استشارة الطبيب، لأن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تناول جرعة زائدة من الكالسيوم، والتي قد تكون مُميتة في أغلب الأحيان. أسباب نقص الكالسيوم من الأسباب التي تؤدي إلى نقص الكالسيوم عند الإنسان ما يلي: بعض الأمراض التي تصيب الإنسان قد تؤدي إلى نقص الكالسيوم في الجسم، ومن هذه الأمراض أمراض السرطان، والتهاب البنكرياس، حيث تؤدي بعض الإنخفاض مستوى الغدة الدرقية، والتي تعمل على نقص الكالسيوم. بعض العمليات الجراحية تؤدي إلى نقص الكالسيوم عند الإنسان، مثل عملية تخفيف المعدة، كما أن تناول الأدوية مثل مدرات البول والعلاجات الكيميائية قد تؤثر على امتصاص الكالسيوم الموجود في جسم الإنسان. الشيخوخة وكبر السن، حيث أنه كلما تقدم العمر يستهلك الجسم مخزون الكالسيوم، وبالتالي تكون احتمال إصابته بهشاشة العظام أو نقص الكالسيوم كبيرة. الأشخاص المحتمل إصابتهم بنقص الكالسيوم المرأة الحامل: حيث أنها تكون بحاجة مُتزايدة لكمية الكالسيوم، وهم أكثر عُرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام أو نقص الكالسيوم. تحتاج المرأة الحامل إلى نسبة كالسيوم لنمو عظام الجنين، وغالبا ما ينصح الأطباء النساء

العظام و ترقق العظام. نقص مستوى الكالسيوم في الدم يحدث كآثر جانبي من تأثير الأدوية مثل مدرات البول، وبعض العلاجات الطبية لأمراض معينة مثل فشل الكلوي، ولكن لا يحدث هذا النوع بسبب نقص كمية الكالسيوم في النظام الغذائي، فإذا حدث فإن الجسم يأخذ كفايته من مخزون الكالسيوم في العظام للحفاظ على مستويات الكالسيوم الموجودة في الدم لأداء وظائف الجسم الحيوية مثل الأعصاب و العضلات والمخ و القلب. طرق علاج نقص الكالسيوم حل مشاكل نقص الكالسيوم قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الغدة الإنسبان هو أمر ضروري لتجنب حدوث مشاكل صحية، وللحفاظ على صحة العظام وسلامتها، حيث يمكن علاجها بإحدى الطرق التالية: تغيير نمط الغذاء المتبع، حيث إن المراحل الأولية لنقص الكالسيوم يمكن علاجها بتناول كميات أكبر من الأطعمة التي تحتوي على كالسيوم، مثل الحليب ومشتقاته، واللحوم والأسماك، كما يجب أيضا تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «د» لتقوية امتصاص الكالسيوم. إذا لم تستطع الحصول على كمية كافية من الكالسيوم خلال اليوم، فيمكنك أن تتناول أقراص مكمل للكالسيوم، وغالبا ما يوصي بها الطبيب. يمكن علاج نقص الكالسيوم عن طريق أخذ حقن الكالسيوم، وغالبا ما تؤخذ إذا لم يطرأ أي تغيير على نسبة الكالسيوم مع كمية الغذاء الغني بالكالسيوم

باحثون :الإسبرين يقي من « السرطان »



بالأورام بنسبة 3% تقريبا بين من يتناولون الأسبرين بصفة منتظمة بالنسبة إلى من لا يتعاطونه بصفة دورية. كما تراجع نسبة 15% مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، أما بالنسبة لسرطان القولون تحديدا فقد تراجع بنسبة 19% بين من يتعاطون الأسبرين بصفة منتظمة. ولم يرتبط الأسبرين بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان الصدر والبروستاتا والرئة حتى الآن.

أنواع السرطان، حيث يعمل الأسبرين على إزالة الالتهابات من شتى أعضاء الجسم ويؤثر على إحدى المواد الطبيعية المسؤولة عن أورام القولون، وهو الأمر الذي قد يقلل من احتمالات ظهور باقي الأورام. واستعان الباحثون في دراستهم بـ140 ألف شخص تقريبا، تراوحت متوسطات أعمارهم بين 30 و75 عاما تمت متابعتهم على مدار 32 عاما. النتائج أظهرت تراجع احتمالات الإصابة

أظهرت دراسة أميركية جديدة أن استخدام الأسبرين لفترات طويلة قد يرتبط بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان القولون وبقيّة أنواع السرطان في الجسم. ويعد الأسبرين أحد أشهر الأدوية وأكثرها شعبية وكذلك علاج العديد من الأمراض، وأظهرت دراسة لمستشفى «ماساتشوستس» نشرت في دورية «جاما للأورام» أن استخدام الأسبرين لفترات طويلة يساعد بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان القولون وباقي

الموز.. ينصح الأطباء عادة لمختلف الأمراض، لما له من فوائد صحية تشمل أعضاء جسم الإنسان كافة، حيث يتركب الموز من عناصر غذائية غنية وفيتامينات وإلياف، كما أنه يحوي وبكثرة عنصر البوتاسيوم.

لكن ماذا عن الموز الأسود؟ هناك عادة خاطئة سارية ومتداولة بين الناس، فمنهم من يعتقد أن سواد الموز يعني «عفته»، وأنه أصبح غير صالح للأكل وعليها رمية، لكن حقيقة الدراسات أثبتت عكس ذلك.

حيث ثبت أن هذه البقع البنية تدلّ فعليا على نضوج الموز، وكلما ازداد وجودها زادت نسبة احتوائه على مادة يطلق عليها رمز TNF. وترمز تسمية هذه المادة في اللغة الإنجليزية إلى عبارة Tumor Necrosis Factor، أي «عامل النخر الورمي»، ما يعني أنها مادة محاربة لمرض السرطان وتكون الخلايا غير الطبيعية في أجسامنا.

وأعلنت التجارب أن تناول الموز المسود والحصول على كمية كافية مادة TNF من شأنه أن يصد خلايا الورم السرطاني ويحد من نموها وتكاثرها بشكل لافت.



لا تتردد في شراء الموز الأسود