

## مختصون دعوا زملاءهم الأطباء إلى التروي في المعالجة

**٩٠ في المئة من عمليات بتر القدم بسبب «السكري» .. لا لزوم لها طبياً**

لدى الأفراد المعرضين  
وراثياً للإصابة به. وأعلن  
الباحثون الفنلنديون هذه  
النتائج بعدما راقبوا أكثر  
من 500 رجل وامرأة من  
المعرضين للسكري طوال  
سنوات عدة.

دور أكبر لهرمون  
«أديبونكتين»  
في المؤتمر الأوروبي  
حول السكري في ميونخ،  
تحدث البروفيسور  
إيبرهارد شتايندل عن  
دور أخطر مما هو متوقع  
له من «أديبونكتين».

يتم فرز الهرمون من قبل خلايا الجسم الدهنية، وهذا يعني أن سرعة حرق الخلايا الدهنية ستؤدي إلى رفع مستواه في الدم. ويقلل فرز أديبونكتين في الجسم حينما تكتنز الخلايا الدهنية بالشحم، ولهذا فإن قرط البدانة يعني كبح فرز هذا الهرمون.

وثبت من خلال الفحوصات أن مستوى أديبونكتين في دماء البدانة منخفض تماماً، وهذا يؤدي بدوره إلى كبح فرز هرمون الإنسولين، وبالتالي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم.

وانتقد شتأندل مظاهر الحياة المعاصرة، وقال إنها مسؤولة عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري على المستوى العالمي. ورغم أن الأطباء يطالبون البدانة بالحركة، فإن حركة معظم البشر اقتصرت اليوم على «الحركة داخل الإنترنت».

ويعتقد شتأندل أن هذا الهرمون يعمل بمثابة عامل مساعد على إصابة البشر بـ2-12 ألف طبيب متخصص حضروا المؤتمر، إن نقص أديبونكتين يضر بالأوعية الدموية قبل فترة طويلة من ظهور السكري بأعراضه الواضحة.

وبحسب رأي الطبيب من عيادة «شفابينغ» البافارافية فإن الكشف عن انتفاخ مستوىيات أديبونكتين في الدم يمكن أن يعمل بمثابة

A close-up illustration of a person's hand, likely belonging to a woman, holding a small, light-colored object between the thumb and forefinger. The hand is positioned vertically on the right side of the frame.



حيث يعالج المرضى في عيادات عالية التخصص، كما تراجع عمليات البتر في إيطاليا وهولندا، في حين إنها ترتفع قليلاً فيألمانيا.

من ناحيته، أعلن فيرنر لانغ، رئيس قسم الأوعية الدموية في عيادة أيرلانغن (جنوب) ورئيس جمعية «قدم السكري» الألمانية، أنه لم تتم في عيادته أية عملية بتر ساق أو قدم في العام الماضي.

ونذكر لانغ أن عيادته تنجح دائمًا في توسيع الشرايين من خلال العلاج

نسبة الغلوكوز في الدم فقط. وغالباً ما يخطي الطبيب، وكذلك المريض في تشخيص الأعراض الأولى لمتلازمة «قد السكري» بشكل مبكر. هذه الأعراض التي تتبدي بثقل السمع وعنة حركة الجسم. ووجه أنغيكورت عناني الأطباء إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت عام 1989 بضرورة خفض عمليات بـ«أعضاء مرضى السكري» إلى النصف. ويجرؤ ذلك حالياً بشكل جيد في بلدان أوروبا الشرقية

**بالسكرى كل 12 دفعة** العالم، بالقول إن من هذه العمليات لها. وأضاف أنغوف المتخصص فى الأووعية الدموية، إن هذه الأعضاء المبتورة من الممكن إنقاذهما معالجة الحالات صحية.

**إيلاف نت** : نشرت شركة التأمين الصحى «أوك» فى أماناً إحصائية مثيرة للقلق عن مضاعفات الدورة الدموية التي يتعرض لها المعانون من داء السكري. وذكرت «أوك» فى آخر إحصائية لها أن 55 ألف ألمانى من مرضى السكر، أحضروا العمليات

السريري (المستوى) تختلف  
قطع القدم أو الساق في  
العام الماضي. ووصف  
معظم المتخصصين في  
معالجة داء السكري هذه  
الأرقام بـ«اللالازوم لها»،  
داعين زملائهم الأطباء إلى  
التروي في المعالجة.  
تشمل عمليات البتر

تكشف إحصائيات دورتموند للذكور (متخصصة) عن 20% من الحالات فقط في حين ترتفع هذه في بعض العيادات غير المتخصصة إلى وأشار البروفيسور يقود قسم الأوعية 5 دورتموند، إلى معان من السكر المانيا. يضاف إلى ألف مريض جد عام، مع وجود مؤشر ارتفاع مطرد الحالات.

ال المؤسفة في ألمانيا من مرضي السكري في العيادات المتخصصة، و- 10% منهم في العيادات والمستشفيات العامة. وحسن الحظ فإن 80% من عمليات البتر أصابت القدم أو أجزاء منها (عمليات البتر الصغرى)، لأن عمليات البتر العظمي تشمل القدم وجزءاً من الساق أو الساق بكمالها) تشكل 20% فقط، ولكن لا يعيش من هو لاء لفترة تزيد على 5 سنوات، تلي البتر، غير نسبة الرابع.

سوء معالجة

**علق البروفيسور  
بيرنهارد أنغينيورت على  
الإحصائية، التي أشارت  
إلى بتر قدم أو ساق مصاب**

## الفضول والنكهة والتكلفة الأقل تدفع بالشباب إلى تجربة السجائر الإلكترونية



وقالت الدراسة التي قادها أستاذة كلية الطب بجامعة بيل إن الدافع الأكثر ترجيحاً هو التكلفة فهي أقل بكثير من السجائر العاديّة إلى جانب إمكانية تدخين السجائر الإلكترونيّة في الأماكن التي تمنع التدخين.

وتشير تقديرات العديد من شركات تصنيع السجائر الإلكترونيّة إلى أن سعرها قد يختلف كثيراً، وفقاً للنوع والضرائب التي تفرضها الولاية على السجائر لكن الفارق قد يصل إلى آلاف الدولارات سنويّاً بالنسبة للمدخن العادي.

واستندت الدراسة ومقرها ولاية كونيتيكت إلى عمليات مسح لمدرستين للمرحلة الإعدادية ومدرسة ثانوية في خريف عام 2013 وربيع 2014.

وكان نحو 340 من بين 2100 طالب شملتهم الدراسة يدخنون السجائر الإلكترونيّة.

العربّية نت : خلصت دراسة نشرت مس الاثنين إلى أن الشبان يجربون السجائر الإلكترونيّة بدافع حب الاستطلاع ونكهاتها لجاذبية المتنوعة، التي تتراوح من حلوي فرزيل البنات إلى البيتز إلا أن استمراهم في تدخينها يرجع إلى انخفاض سعرها.

وقال أكثر من نصف المشاركون في الدراسة منهم جربوا السجائر الإلكترونيّة بدافع حب الاستطلاع، فيما وأشارت نسبة 41.8% منهم إلى «النكهات الجيدة» وأرجع قرابة الثالث ذلك إلى تشجيع الأصدقاء.

وذكر التقرير الذي نشرته دورية بيبياتريكس /طب الأطفال) الطبية أن بعض الأسباب التي تدفع المراهقين إلى تجربة السجائر التي تعمل بالبطارية وتقوم بتسخين سوائل حتى ينبع بخار الماء بدلًا من حرق النيكوتين تساعد في التكهن باستماراوية تدخينها.

# المصابون بـ «الربو» يمكنهم الاستغناء عن البخاخات .. نهائياً

في بريطانيا، فيما يعاني 5 ملايين شخص بالبلاد من المرض. ويوضح كرييس برايتلينغ، وهو أستاذ في طب التنفس في جامعة لستر، أن الأقراد التي استغرق تطويرها نحو عقدين من الزمن، ستساعد على الحماية من أزمات التنفس، وستقلل من حالات دخول المرضى إلى المستشفيات.

وأضاف أن من تناولوا تلك الأقراد أصبحوا أكثر قدرة على صعود السلالم بشكل عادي دون مصاعب تنفسية، كما يأتوا يعملون ويلعبون مع أبنائهم بصورة أكثر حرمة.

«سكاي نيوز»: حملت دراسة بريطانية بـ 15 ساراً للمساكن بالبلدو، ذلك أنه قد يكون يوسعهم، مما قريب، أن يعواضوا البخاخات التقليدية، بأقراص من الدواء يتناولونها مرتين في اليوم الواحد.

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن الأقراص المسماة «فيفي ببيرن» ستطاعت أن تحدث تحسناً كبيراً في التنفس لدى المرضى الذين تناولوها.

ولا تزال الأقراص في مرحلة تجريبية، خلال الوقت الحالي، لكنها قد تصبح متاحة في السوق بشكل عادي خلال 3 سنوات.

وبعد الربوة المئوية، وفاة 3 أشخاص، كل يوم

# الحصول على المزيد من البروتين من مصادر نباتية .. يطيل العمر



الباحث بمجال التغذية والزميل الفخري بمعهد أبحاث الغذاء في بريطانيا «يبدو أن هذا العمل المثير والقوي يدعم الإجماع المتزايد على أن النظام الغذائي المعتمد إلى حد كبير على الأغذية النباتية أفضل للصحة على المدى الطويل من النظم الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان، لكنه لا يخبرنا الكثير عن آلية ذلك».

وأضاف «ينبغي على الدراسات المستقلة فحص الآليات الكامنة وراء التأثيرات المختلفة للبروتينات النباتية والحيوانية - جنبا إلى جنب مع دراسة أكثر المصادر المختلفة من البروتينات الحيوانية - على الصحة العامة».

وقال الدكتور، إيان جونسون ماساتشوستس العام «نتائجنا تشير إلى أن الناس يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار تناول المزيد من البروتينات النباتية أكثر من البروتينات الحيوانية، وأنه عندما يختار الناس بين مصادر البروتين الحيواني فإن الأسماك والدجاج على الأرجح أفضل الخيارات».

لأي سبب كان بنسبة 10 في المئة خلال فترة الدراسة.

كما صاحب زيادة السعرات الحرارية من البروتينات النباتية انخفاض آخر بنسبة 12 في المئة في احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب.

ولكن زيادة حصة السعرات الحرارية من البروتين الحيواني بنسبة 10 في المئة أدى إلى ارتفاع احتمال الوفاة بنسبة 2 في المئة.

كما صاحبها ارتفاع احتمالات الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة 8 في المئة.

وبعد الارتباط أقوى لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أخرى، مثل السمنة، والتدخين، والإفراط في شرب الخمر، أو عنده ممارسة الرياضة بكثرة.

وفي هذه الدراسة، جمعت المعلومات عن نمط حياة المشاركون والمعلومات الطبية الخاصة بهم مرة كل عامين. وكان على هؤلاء ملء استبيان مرة كل أربع سنوات عن الطبيعة المحددة لما تناولوه من غذاء في العام المنصرم.

وإجمالاً، توفي أكثر من 36 ألف شخص، منهم نحو 9000 شخص بسبب مرض في القلب والأوعية الدموية، ونحو 13000 بسبب السرطان، ونحو 14000 لأسباب أخرى.

وقال مينغ يانغ سونغ المشاركون في الدراسة والذى يعما بمستشفى