

دراسة : التوّريزيد من انتشار الخلايا السرطانية



بالإجهاد النفسي سوف يؤدي بالضرورة إلى تفاقم المرض، وانتشاره بصورة أوسع في جسم المصاب.

وقال العلماء الذين أجرروا الدراسة إن التوتر النفسي لطالما ظل على ارتباط وثيق بالعديد من الأمراض بما فيها أورام الصدر والبروستات، إلا أن هذا الارتباط ظل طوال الفترة الماضية عبارة عن لغز لم يتمكن الأطباء من تحليله، فيما تعتبر نتائج هذه الدراسة بداية لتفكيك لغز الارتباط بين التوتر النفسي وأمراض السرطان.

ونقلت جريدة «ديلي ميرور» البريطانية عن الدكتور إريكا صلون، رئيس الفريق البحثي التابع لجامعة «موناش» الأسترالية والذي أجرى الدراسة أن النظام الليمفاوي يتاثر بفعالية كبيرة بهرمونات الإجهاد النفسي، وهو ما أدى إلى انتشار الخلايا السرطانية في الفأر الذي أجريت عليه التجارب. يشار إلى أن سلطان الثدي يعتبر الأوسع انتشاراً بين السيدات في العالم، أما سرطان البروستات فهو الأوسع انتشاراً بين الرجال في العالم، ويؤدي كل من المرضين إلى مئات الآلاف الوفيات سنوياً في مختلف أنحاء العالم.

أظهرت دراسة طبية جديدة أجريت في أستراليا أن التوتر والإجهاد النفسي تسبب بانتشار الخلايا السرطانية في سسم المريض، حيث وجد الباحثون أن ضغوط النفسية تؤدي إلى شحن كبير فائق للأوعية الدموية في الجسم بما عزز من حركة الخلايا السرطانية ويساعد ن انتشار المرض في الجسم.

ووجد العلماء أن الهرمونات التي تنتج من الإجهاد والتوتر النفسي تزيد من خلايا السرطانية في «النظام الليفاوي» الذي يقوم بدوره بنقل هذه الخلايا إلى مكان جديدة، بما يؤدي إلى انتشار المرض في جسم الإنسان.

وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد أن جريت التجارب والفحوص على الفئران، لأن العلماء قالوا إن هذه النتائج تمثل خرقاً من شأنه لاحقاً تحديد كيفية سيطرة على مرض السرطان، ومن شأنه المساعدة في التوصل إلى علاجات للمرض.

وبهذه النتائج يتبعن على الأطباء وذوي المرضى مراعاة الحالة النفسية للمصابين بالسرطان، حيث إن هذا البحث يفيد بأن دهور الحالة النفسية للمريض وشعوره

باحثون : الإسبرين يقي من «السرطان»



بالأورام بنسبة 3% تقريباً بين من يتناولون الأسريرين بصفة منتظمة بالنسبة إلى من لا يتعاطونه بصفة دورية. كما تراجعت بنسبة 15% مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي. أما بالنسبة لسرطان القولون تحديداً فقد تراجع بنسبة 19% بين من يتعاطون الأسريرين بصفة منتظمة. ولم يرتبط الأسريرين بتراجع مخاطر الإصابة بسرطان الصدر والبروستاتا والرئة حتى الآن.

أنواع السرطان، حيث يعمل الأسبرين على إزالة الالتهابات من شتى أعضاء الجسم ويؤثر على إحدى المواد الطبيعية المسئولة عن أورام القولون، وهو الأمر الذي قد يقلل من احتمالات ظهور باقي الأورام.

واستمعان الباحثون في دراستهم بـ140 ألف شخص تقريباً، تراوحت متوسطات أعمارهم بين 30 و75 عاماً تمت متابعتهم على مدار 32 عاماً.

النتائج أظهرت تراجع احتمالات الإصابة

احتمال وارد، في حين أنه إذا كانت نسبة الكالسيوم الموجودة في جسم الإنسان عالية، فإن الأسنان تكون قوية وناصعة البياض؛ ويختلف لون الأسنان أيضاً بنسبة الكالسيوم، حيث أن اللون الأبيض يدل على وجود كالسيوم جيد في جسم الإنسان. التعرض للكسور: حيث إن نقص الكالسيوم في جسم الإنسان يؤدي إلى ضعف العظام، ومن المحتتمل حدوث كسر في الأعضاء التي تتعرض لحادث حتى لو كان بسيطاً. يُعاني الأشخاص الذين لا يتناولون الكمية الكافية من الكالسيوم خلال اليوم من الأرق، وقلة ساعات النوم، وعدم الحصول على النوم الكافي والعميق. هناك بعض المضاعفات التي قد تحدث للإنسان إذا لم يتناول كمية كافية من الكالسيوم خلال اليوم، مثل هشاشة العظام، وتلف العين، واضطرابات في عدد ضربات القلب، ويمكن أن تؤدي إلى الموت. مرض هشاشة العظام وهو مرض يُصيب الإنسان الذي يُعاني من نقص الكالسيوم، ومن أعراضه صعوبة المشي أو الحركة، كسر في العمود الفقري، العجز. غالباً ما يحدث للنساء، وذلك لأنها تفق الكثير من الكالسيوم خلال فترة الحمل والرضاعة، ويتم علاجه عن طريق تناول الشخص المصاب لأقراص مكملة للكالسيوم، أو يمكن الإكثار من تناول البيض وشرب الحليب، والإكثار أيضاً من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والتي تم ذكرها سابقاً.

الحوامل بتناول أقراص مُكمّلة للكالسيوم لمنع حدوث نقص عن الأم وعند الجنين. الأطفال والراهقين: حيث أنهم في مرحلة نمو سريعة، وبحاجة دائمة للكالسيوم لبناء العظام والأسنان، وينصح الأطفال والإراهقون بتناول البيض وشرب الحليب يومياً عند الإفطار، حيث يساعدهم على النمو السليم. البناتين: وهو الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على النيتروجين، ولا يتناولون أي بروتين من نوع اللحوم، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والتي أيضاً يحتوي البعض منها على الحديد الذي يحد من امتصاص الكالسيوم لجسم الإنسان، ولذلك تكون نسبة إصابتهم بمرض هشاشة العظام أو نقص الكالسيوم كبيرة ومحتملة. أعراض نقص الكالسيوم تتشنج في كفي اليدين والقدمين. تشنجم عضلة القدمين وخاصة الساق خلال النوم. آلام في العضلات الإحساس بتنقل القدمين أو كف اليدين أو الشفتين تغيرات في القدرات العقلية (وتكون غالباً في الحالات المتقدمة لنقص الكالسيوم) انقطاع مؤقت في النفس (وغالباً ما تكون عند الأطفال الخدج أو المواليد) تنصّف الأظافر وجفاف الجلد، حيث إن الأظافر تتأثر بشكل مباشر من نقص الكالسيوم في الجسم، كما أن الجلد والبشرة تجف وخاصة الوجه ضعف الأسنان أو تسوسها: حيث إن نسبة الكالسيوم في جسم الإنسان تؤثر على الأسنان، فإذا كانت قليلة فإن احتمال وقوع الأسنان، أو تسوسها

الذي يزيد يوماً عن نقص آخر في الكالسيوم الطبي، قد تؤدي زائدة في الكالسيوم التي يليه بتصيب إلى نقص الجسم أمراض البنكرياس إلى اندى الدرقية، نقص العملى، إلى نقص المعدة، مثل مرض الكيميا، امتنى الموجو الشيخ حيث استهلاك الكالسيوم احتمال العظام كبيرة، إصابة المرأة تكون لكمية عرضه، هشاشة الكالسيوم الحامل لنفس ما ينذر العظام و ترقق العظام. نقص مستوى الكالسيوم في الدم يحدث كثراً جانبياً من تأثير الأدوية مثل مدرات البول، وبعض العلاجات الطبية لأمراض معينة مثل الفشل الكلوي، ولكن لا يحدث هذا النوع بسبب نقص كمية الكالسيوم في النظام الغذائي، فإذا حدث في الجسم يأخذ خفافيه من مخزون الكالسيوم في العظام للحفاظ على مستويات الكالسيوم الموجودة في الدم لأداء وظائف الجسم الحيوية مثل الأعصاب والعضلات والرئتين والقلب. طرق علاج نقص الكالسيوم حل مشاكل الإنسان هو أمر ضروري لتجنب حدوث مشاكل صحية، وللحفاظ على صحة العظام وسلامتها، حيث يمكن علاجها بإحدى الطرق التالية: تغيير نمط الغذاء المتبعة، حيث إن المراحل الأولى لنقص الكالسيوم يمكن علاجها بتناول كميات أكبر من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل الحليب ومشتقاته، واللحوم والأسماك، كما يجب أيضاً تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «د» لتقوية امتصاص الكالسيوم. إذا لم تستطع الحصول على كمية كافية من الكالسيوم خلال اليوم، فيإمكانك أن تتناول أطعمة مكملة للكالسيوم، وغالباً ما يوصي بها الطبيب. يمكن علاج نقص الكالسيوم عن طريقأخذ حقن الكالسيوم، غالباً ما تؤخذ إذا لم يطرأ أي تغيير على نسبة الكالسيوم مع كمية الغذاء الغني بالكالسيوم الكافية من الكالسيوم، وإذا أردت الأمراً يجدر تناول الأطعمة المكملة للكالسيوم، منها الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم يحصل جسم الإنسان على الكالسيوم من خلال تناوله لأطعمة عديدة تحتوي على عنصر الكالسيوم، منها الحليب وممنتجاته، والبيض، والماكولات البحرية، وعصير البرتقال، وبعض حبوب الإفطار، والمكسرات، والفاصلوليا المجنفة، للحوم، والخضروات الورقية كالسبانخ والملفوف، والسمسم، واللوز والجوز، والتين المحفف، والدبس، وبذور عباد الشمس، والشعير، ونخالة الذرة، لتفاح، الدجاج، الفراولة، البروكولي، المشمش المحفف، قبول الصوديا، كاسترد، لسمك، الآيس كريم، معلبات السردين، معلبات سمك السلمون، الزبادي مُنخفض الدهون، وجبن الشيدر. نقص الكالسيوم وهو عدم كفاية مستوى الكالسيوم في الجسم، ويحدث من عدم وجود مستويات مناسبة من الكالسيوم في المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان خلال فترة من الزمن، مثل نقص فيتامين (د)، والفسفور والمغنيسيوم التي تساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، وهناك نوعان لنقص الكالسيوم في الجسم: نقص الكالسيوم في الغذاء، مما يحدث بسبب عدم وجود نفس كافية من الكالسيوم في الغذاء، مما يؤدي إلى الحصول الجسم على كفيته من مخازن الكالسيوم الموجودة في العظام، مما يؤدي إلى الإصابة بشاشة

لا تتردد في شراء الموز الأسود

الموز.. ينصح الأطباء عادةً لمختلف الأمراض، لما من فوائد صحية تشمل أعضاء جسم الإنسان كافة، حيث يتربّك الموز من عناصر غذائية غنية في فيتامينات واللياف، كما أنه يحتوي وبكثرة عنصر ماء.

يُومناسيوم. لكن ماذا عن الموز الأسود؟
هناك عادة خاطئة سارية ومتدولة بين الناس،
من ينتهي من يعتقد أن سواد الموز يعني «عفنه»، وأنه
سبح غير صالح للأكل علينا رميها، لكن حقيقة
الأساس أثبتت عكس ذلك.

حيث ثبت أن هذه البقع البنية تدلّ فعلياً على نسوج الموز، وكلما ازداد وجودها زادت نسبة TNF على مادة يطلق عليها رمز TNF-a، عبارة عن تسمية هذه المادة في اللغة الإنجليزية Tumor Necrosis Factor، أي

وأعلنت التجارب أن تناول الموز المسود الحصول على كمية كافية مادة TNF من شأنه يصد خلايا الورم السرطاني ويحد من نموها

