



لتشخيص الحالة لابد من أخذ التاريخ المرضي الكامل ومعرفة وجود المؤثرات السلبية

د. الكندري : تأخر الإنجاب يصيب 15 % من الرجال

تعد مشكلات المسالك البولية الطبية من المشكلات المعقدة ، والتي تحتاج دائماً إلى استشارة الطبيب المختص ، ولأن هذه المشكلات يعاني منها الكثير من الناس ، وكذلك يحتاج الكثير منا إلى فهم ما يدور في ذلك الجهاز الدقيق عند الإنسان ، فقد تحدث إلينا الدكتور أحمد الكندري استاذ مساعد في جراحة المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الكويت ، والذي أكد أن مشكلات المسالك البولية تحتاج الى فهم وتشخيص سليمين ، وقال الكندري إن صعوبات واضطرابات التبول عند الشباب دون سن الأربعين عادة ما تكون بسبب انقباض عنق المثانة أو انقباض عضلة التحكم أثناء التبول ..

فإلى تفاصيل اللقاء ...

ويتم تقييم الحالة بأخذ التاريخ المرضي ، وبعدهما بالفحص السريري ، ويتم عمل الفحوصات اللازمة وبالأخص تحليل البول ، ومن الفحوصات المفيدة أيضاً فحص تخطيط المثانة أو ديناميكتها

وفي العلاج : من المهم تعليم المرضى بالصيانة وتعريفهم بمستقبلها الحميد حتى لا يصاب المرضى بالقلق من الحالة ، وكذلك فإن العلاج السلوكي بتقليل السوائل وبالأخص المحذوبة على الكافيين يلعب في تقليل ادراج البول الذي يهيج تلك الحالة ، كما إن تفريغ المثانة بشكل منتظم يخفف من فرص مفاجئة التبول ، وتستخدم الأدوية التي تؤخذ بالغم بتقليل تطلصات المثانة وتحسين الحالة بنسبة قد تصل الى 70% من الحالات ، ومن سبلات تلك الأدوية جفاف البلعوم والأمساك ، لذا فمن المهم تنبيه المرضى للتعامل معها ، والتي غالباً ما تكون محتملة وبالأخص في الأنواع الأحدث من تلك الأدوية

أما الحالات الشديدة من المثانة المشددة ، والتي لم تستجب للأدوية التي تؤخذ بالغم فليمن مساعدتها بحقن المثانة بمادة البوتوكس ، ويجرى ذلك الأمر عادة تحت التخدير لتسهيل ودقة الحقن على المرضى ، وتعتبر من أساليب التدخل البسيطة والتي يمكن للمرضى مغادرة المستشفى في نفس اليوم ، ويعتبر أسلوب البوتوكس للمثانة فعالاً بنسبة 60%-70 من تلك الحالات الشديدة ، وهي تعتبر نسبة جيدة تستحق الاستخدام ، ومن سبلات البوتوكس هو تكلفة الدواء وأيضاً الحاجة لإعادة الحقن والتي عادة ما تحصل في حالات الاستجابة من 6 أشهر الى سنة ، وأيضاً فإن من وسائل علاج حالات المثانة المشددة استخدام المنظم الكهربائي لأعصاب المثانة ، ويعتبر العلاج مفيداً وفعالاً أيضاً بنسبة 60%-70 من الحالات ، ويتم ذلك بعد فترة الاختيار ، والذي يتم عن طريق وضع سلك في أسفل الظهر ، ويربط بجهاز كهربائي خارجي ، فإذا أظهر الاختبار تحسناً خلال 3-7 أيام يتم بعدها وضع المنظم الكهربائي بعملية جراحية في أسفل الظهر ، وفي السنوات الأخيرة تم تطوير جهاز كهربائي خارجي لإشارة عصب في الرجل يؤدي للمقاير الإيجابية على أعصاب المثانة ، ويتم ذلك عن طريق جلسات متكررة ، وأخيراً بصر حجم المثانة غالباً تحتاج الى عملية توسيع المثانة ،

سوتار الخصيتين ، وهو مفيد لتقييم حجم الخصية ودوالي الخصية ، ويساعد بالأخص في حالات الدوالي التي يصعب تقييمها سريريًا مثل سماعة جدار الخصية. وكذلك في حالات ما بعد عمليات الدوالي

كذلك يمكن إجراء فحص DNA للسائل المنوي: بحيث تحسب كمية التكسر فيه ، ويعتبر من الفحوصات الحديثة والمفيد لآليات ضعف السائل المنوي الجراحة الميكروسكوبية يقال انه يوجد حالياً طرق جديدة لعلاج ضعف الحيوانات المنوية ، حدثنا عنها؟

يعتبر علاج دوالي الخصية بالجراح الميكروسكوبية من أفضل الوسائل الطبية في علاج ضعف السائل المنوي في تلك الحالات ، وذلك بسبب الدقة العالية في طريقة العملية لعلاج الدوالي وتقليل فرص رجوعها أو حصول السليبات مثل تجمع الماء حول الخصية ، وتعتبر الجراح الميكروسكوبية الحل الأمثل لتحسين وظائف السائل المنوي في حالات الدوالي



... وبعد إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى

في حالات النقص الشديد للحيوانات المنوية يُنصح بعمل تحليل للهرمونات المرتبطة بالإنجاب

علاج دوالي الخصية بالجراحة الميكروسكوبية يعتبر من أفضل الوسائل الطبية في شفاء ضعف السائل المنوي

الحالات الشديدة من المثانة المشددة والتي لم تستجب للأدوية التي تؤخذ بالغم يمكن مساعدتها بحقنها بـ «البوتوكس»

الحالة فشتمل تحليلاً للسائل المنوي مرتين على الأقل ، بشرط أن يعرض يوعان الى ثلاثة أيام بعد آخر معايشرة زوجية لإعطاء العينات

وفي حالات النقص الشديد للحيوانات المنوية يُنصح بعمل تحليل للهرمونات المرتبطة بالإنجاب

الحالة فشتمل تحليلاً للسائل المنوي مرتين على الأقل ، بشرط أن يعرض يوعان الى ثلاثة أيام بعد آخر معايشرة زوجية لإعطاء العينات

وفي حالات النقص الشديد للحيوانات المنوية يُنصح بعمل تحليل للهرمونات المرتبطة بالإنجاب

أطعمة تزيد من مستوى الهيموغلوبين في الدم

زيادة مستوى الهيموغلوبين في الدم ، لأنه غني بالحديد واليوتاسيوم والألياف. 5 - التفاح

في حالة الهيموغلوبين ، يصدق المثل الشهير «نقاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً» ، وذلك لأن التفاح غني بالحديد ، وتناول نقاحة واحدة يومياً كفيل برفع الهيموغلوبين للمستوى الأمثل.

ولن يعاني من نقص الهيموغلوبين في الدم ، ينصح الأطباء بتخصير عصير سحري يتكون من نقاحة مشقوقة وللمرة ينجر أو شمندر وعصير ليمونة والقليل من الزنجبيل ، والحرص على تناول ذلك العصير مرتين يومياً من أجل نتائج علاجية هائلة.

والغنية بالحديد إلى نظام غذائك اليومي ، ومنها الكبد واللحوم الحمراء والسيانخ واللوز والتفاح والعسل ، كما يمكن تناول مكملات الحديد الدوائية ، بعد استشارة الطبيب بالطبع.

3 - الأطعمة الغنية بفيتامين «C»

نقص فيتامين «C» في الجسم يسبب انخفاضاً في مستوى الهيموغلوبين في الدم ، لذا يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «C» مثل البرتقال والليمون والفراولة والفرايب فروت والطماطم والبابايا والسيانخ لضمان مستوى معتدل من الهيموغلوبين.

4 - التينجر أو الشمندر

التينجر أو الشمندر من أفضل الأطعمة التي تساعد في

وبحسب تقرير نشره موقع «بولد سكاى» المعنى بالصحة ، فإن هناك عدداً من الأطعمة التي تعزز من مستوى الهيموغلوبين في الدم ، ومنها:

1 - الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

عندما يعاني الجسم من نقص في حمض الفوليك ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص المعروف بفيتامين «B-12» المركب ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في مستوى الهيموغلوبين في الدم . والأغذية الغنية بحمض الفوليك هي الأوراق الخضراء والفول السوداني والكبد والحبوب والموز.

2 - الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج الهيموغلوبين ، لذا يجب التأكد من إدراج الأطعمة

وبحسب تقرير نشره موقع «بولد سكاى» المعنى بالصحة ، فإن هناك عدداً من الأطعمة التي تعزز من مستوى الهيموغلوبين في الدم ، ومنها:

1 - الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

عندما يعاني الجسم من نقص في حمض الفوليك ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص المعروف بفيتامين «B-12» المركب ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في مستوى الهيموغلوبين في الدم . والأغذية الغنية بحمض الفوليك هي الأوراق الخضراء والفول السوداني والكبد والحبوب والموز.

2 - الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج الهيموغلوبين ، لذا يجب التأكد من إدراج الأطعمة

وبحسب تقرير نشره موقع «بولد سكاى» المعنى بالصحة ، فإن هناك عدداً من الأطعمة التي تعزز من مستوى الهيموغلوبين في الدم ، ومنها:

1 - الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

عندما يعاني الجسم من نقص في حمض الفوليك ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص المعروف بفيتامين «B-12» المركب ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في مستوى الهيموغلوبين في الدم . والأغذية الغنية بحمض الفوليك هي الأوراق الخضراء والفول السوداني والكبد والحبوب والموز.

2 - الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج الهيموغلوبين ، لذا يجب التأكد من إدراج الأطعمة

«العربية» : انتشر بالتعب والإرهاق والوهن؟ هل تجد صعوبة في التنفس في بعض الأحيان؟ تعاني من الصداع على فترات متقطعة؟ انتشر بسرعة ضربات القلب؟ انتشر ببرودة في يديك وقدميك؟ ماذا عن شهيتك للطعام... هل قلت؟

إذا أجبت على هذه الأسئلة بـ«نعم» ، فلا يجب أن تهمل هذه الأعراض على الإطلاق ، فانت ربما تعاني من نقص الهيموغلوبين في الدم.

والهيموغلوبين هو نوع من البروتين الغني بالحديد والذي يتواجد داخل كرات الدم الحمراء ، وهو مسؤول عن نقل الأكسجين إلى كل أعضاء الجسم. كما أن الهيموغلوبين يساعد أيضاً في التخلص من ذائى أكسيد الكربون عن

«العربية» : انتشر بالتعب والإرهاق والوهن؟ هل تجد صعوبة في التنفس في بعض الأحيان؟ تعاني من الصداع على فترات متقطعة؟ انتشر بسرعة ضربات القلب؟ انتشر ببرودة في يديك وقدميك؟ ماذا عن شهيتك للطعام... هل قلت؟

إذا أجبت على هذه الأسئلة بـ«نعم» ، فلا يجب أن تهمل هذه الأعراض على الإطلاق ، فانت ربما تعاني من نقص الهيموغلوبين في الدم.

والهيموغلوبين هو نوع من البروتين الغني بالحديد والذي يتواجد داخل كرات الدم الحمراء ، وهو مسؤول عن نقل الأكسجين إلى كل أعضاء الجسم. كما أن الهيموغلوبين يساعد أيضاً في التخلص من ذائى أكسيد الكربون عن