

من أكثر الحالات الشائعة في عيادات الأطباء

التهابات الحلق المزعجة بين الفيروس والبكتيريا

- التهاب الحلق الحاد، وارتفاع درجة الحرارة وغيرها. لهذا فإن علاج التهاب الحلق المفضل هو:
 - الغرغرة بماء ساخن ومالح يساعد على تهوية المنطقة المصابة.
 - يمكن الاستعانة باقراص مص لتخفيف الألم (عملية مص الاقراص ترفع من ترکيز اللعاب في الفم، وتساعد على ترطيب المنطقة المطلة، بالإضافة لذلك، يحتوي جزء من القراء المص في الصيدليات على ترکيز منخفض من مسكنات الألم).
 - قد يخفف جهاز البخار من الأعراض، خاصة في حالات التهاب الحلق الشائع عن هواء جاف وتنفس عن طريق الفم.
 - البخاخ (spray) - هذه البخاخات تعمل على ترطيب الفم وتحتوي على مسكنات الألم.
 - تناول أدوية للسكن من الألم بشكل قوي.
 - في بعض الحالات الصعبة والتي لم يتجاوب فيها الشخص للريض مع أي من امكانيات العلاج المشروحة سابقاً وما زال يعاني من مشاكل وصعوبة في البلع يصف الاطباء امكانية العلاج بواسطة الجلووكورتيكوسيدرونات الذي من شأنه أن يساعد المريض في التغلب على صعوبة عوارض المرض.
- التهاب الحيز البلعومي الخلقي عوارض أولية لمرض HIV
 - مضاعفات التهاب الحلق قد يؤدي اهمال التهاب الحلق لحمى الروماتيزم Rheumatic fever (RF) وهو مرض التهاب يظهر عند الاطفال والبالغين، يصيب اجهزة عديدة في الجسم كالقلب، المفاصل، جهاز الاعصاب المركزي والجلد، وهو نتيجة لعدم علاج التهاب الحلق الذي يشمل وجود جرثومة من نوع العقدية «A» Streptococcus A. نسبة انتشار المرض هي في جال العمر 5-15، دون وجود ترق بين الينين والبنان. يظهر حسب معطيات احصائية ان 3%-3% من الاطفال الحلق من نوع صبيوا بالتهاب الحلق من نوع العقدية «A»، ولم يعالجو كما يجب، ظهرت لديهم بعد ذلك حمى الروماتيزم.
 - علاج التهاب الحلق يتم التعامل من التهاب الحلق، بشكل عام، تلقائياً، دون تدخل طبي. بعد ان يكون اخذ المرض وقته الكافي، ما اذا كان التهاب الحلق على تفاقية عدو فبروسية او جرثومية والترافق مع حرارة مرتفعة، فهنا من المفضل مراجعة وتدخل الطبيب.
 - علاج التهاب الحلق يأتي بهدف تخفيف عوارض المرض

الغرغرة

بـ ماء ساخن

تخفف من ألم

المنطقة المصابة

- انتفاخ وآلم بالفك والقعدة الليمفاوية
- آلم يمطرن (في الأساس لدى الأطفال)
- تقيؤ (في الأساس لدى الأطفال مع التهاب حلق)
- حالات خطيرة في التهاب الحلق: لدى المرضى مع عوارض مرض جديدة ووخيمة كالافرازات، التبول الزائد، خلل وتغيير في الصوت، تورم الرقبة أو صعوبة في البلع علينا الانتباه اليهم بصورة أكثر جدية وفحص حالات شديدة للمضاعفات التي قد تحصل نتيجة لالتهابات الحلق ومنها:
- التهاب لسان المزمار
- الخراج (abscess) حول اللوزة
- التهاب الحيز تحت الفك السفلي

(throat) الناجم عن التهاب اللوزتين (Tonsillitis) او الحلق:

- * الم في الحلق ومنطقة البلعوم
- * حرارة مرتفعة
- * الام راس
- * ظهور بقع قاتحة في الحلق واللوزتين
- * الام عند البلع
- * احمرار وانتفاخ اللوزتين، لدى التهاب اللوزتين

في الدم

- * الجرعة الابتدائية للدواء الجديد: تلقى المرضى واحدة من ثلاث جرعات ابتدائية مختلفة من الدواء الجديد (patiromer).
- النتائج:
 - * انخفضت مستويات البوتاسيوم بشكل كبير خلال 4 اسابيع من العلاج وتم المحافظة على مستويات طبيعية من البوتاسيوم خلال 52 اسبوعاً من بداية فترة الدراسة.
 - * يذكر الباحثون أن 20% من المشاركون في الدراسة شهدوا اعراضاً جانبية قد تكون منصلة بالدواء الجديد الذي تناولوه. ومن هذه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً:
 - * مستويات منخفضة من الغلوبين في الدم (في 7% من المرضى).
 - * درجات خفيفة الى معتدلة من الامساك (في 6% من المرضى).
 - * مستويات منخفضة من البوتاسيوم في الدم (في 6% من المرضى).

■ من أعراضها ألم
في الحلق وارتفاع
في درجة الحرارة
وصعوبة في بلع
الطعام

اما بالنسبة للمكتيريا فان نوع المكتيريا الاكثر شيوعا والتي قد تؤدي للتهاب الحلق هي العقدية (*Streptococcus*) والاركانوباكتيريوم (*Arcanobacterium*) للدم (*haemolyticum*) خاصة في اوساط المراهقين، واحيانا تكون مرتبطة بطفح جلدي احمر خفيف. بالإضافة للتدخين، استنشاق هواء ملوث، تنفس هواء حار عن طريق القم، حساسيات مختلفة وحتى الغبار، كلها قادرة على تحفيز (تهيج) التهاب الحلق، يوجد هناك مرض اخر يكون التهاب الحلق فيه العرض الاكثر سرورا، وهو التهاب اللوزتين (*Tonsillitis*). تتوارد اللوزتين في الجزء الخلفي للبلعوم، وكل شخص لوزتان انثنان (واحدة في كل جانب). عند اصابة هذه

**إضافة بعض النكبات إلى الماء
تحبّيه إلى الشارب !**

البوتاسيوم... وخطورة ارتفاع مستوياته في الدم

- * الجرعة الابتدائية للدواء الجديد: تلقى المرضى واحدة من ثلاثة جرعات ابتدائية مختلفة من الدواء الجديد (patiromer).
- النتائج:
 - * انخفاض مستويات البوتاسيوم بشكل كبير خلال 4 أسابيع من العلاج وتم المحافظة على مستويات طبيعية من البوتاسيوم خلال 52 أسبوعاً من بداية فترة الدراسة.
 - * يذكر الباحثون أن 20% من المشاركون في الدراسة شهدوا أعراضًا جانبية قد تكون متعلقة بالدواء الجديد الذي تناولوه، ومن هذه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً:
 - مستويات منخفضة من الغلوبين في الدم (في 7% من المرضى).
 - درجات خفيفة إلى معتدلة من الإمساك (في 6% من المرضى).
 - مستويات منخفضة من البوتاسيوم في الدم (في 6% من المرضى).

A close-up photograph of several small, white, oval-shaped tablets or capsules resting on a light-colored surface. The tablets are slightly overlapping, creating a sense of depth. The lighting highlights their texture and the way they catch the light.

كيف تحصل على قوام مثالي في الثلاثينيات؟

الناس تتغير إذ تزيد المسؤوليات كما ان بعض النساء يدخلن اللذائين ببطل او اكبر، وهذا يصعب ايجاد الوقت اللازم لمارسة الرياضة بالشكل المطلوب.

* حلم القوام المنالى:

تشير دراسات إلى ان زيادة الوزن في الفترة بين العشرين والثلاثين تزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، فالأشخاص الذين يكتسبون 10 كيلوغرامات بين العشرين والثلاثين تزيد نسبة إصابتهم بالأمراض في سنوات العمر اللاحقة.

ومع الوصول للثلاثين يجب تغيير نوعية التمارين الرياضية، إذ يتضاعف الخبراء بالجمع بين تمارين بناء العضلات وتمارين الجري او السباحة، وفقاً لتقرير «بريفيتيه»، ومن المهم الحرص على الاحماء قبل ممارسة أي تمارين رياضية.

وبشكل عام لا يجب الإفراط في ممارسة أنواع الرجيم الصارمة، لكن الاهتمام في هذه المرحلة هو الحفاظ على التغذية المتوازنة الصحية.

تتغير الكثير من الأمور في حياة الرجال النساء عند الوصول للثلاثين تشمل البدانة، زراقم الدهون وكثافة العضلات. وتحدث تغيرات عديدة في الجسم في هذه المرحلة، هي منتصف العشرينات يفرز الجسم بغازارة هرمون الميلاتوتين والسومناتوتروبين هرمونات السعادة «دي إنث اي اي» وكلها تساعد على ممارسة الرياضة بناء العضلات بسرعة. وعند الوصول للثلاثين يبدأ البعد في عملية الأيض التغيير في إفراز الهرمونات المختلفة.

ومن السهل في العشرينات ان تظهر نتائج لأنقذة الغذائية وبالتالي يسهل فقدان الوزن والحصول على جسم رشيق، أما في مرحلة الثلاثينات فيجب زيادة التمارين الرياضية لا يجب ان يقل عدد مرات ممارسة الرياضة عن مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً على أن تزداد التدريب في كل مرة بين 30 و 40 دقيقة، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «بريفيتيه» الأمريكية.

وتزيد صعوبة الحفاظ على الوزن بعد الثلاثين تقريباً لأن الحياة الاجتماعية لمعظم

