



أدلة جديدة تربط بين مقاومة الإنسولين والتدهور الإدراكي



ويتم تقييم الوظائف المعرفية عن طريق اختبارات إلكترونية للذاكرة والوظيفة التنفيذية والمعالجة الحسية البصرية والانتباه. وحتى عندما أخذ الباحثون عوامل الإصابة بالقلب والأوعية الدموية بعين الاعتبار وجدوا أن ارتفاع مستويات مقاومة الإنسولين لا تزال مرتبطة بتفاقم التدهور الإدراكي. وفطت الصلة واضحة عندما استثنى الباحثون الأشخاص الذين أصيبوا بجلطة من قبل أو بالخرف أو بالسكري. وأشار الباحثون في دراستهم التي نشرت دورية مرض الزهايمر إلى أن أحد أوجه الغصور فيها هو أن معظم المشاركين رجال إذ قد تختلف النتائج بين النساء. وقالت باربرا بندان وهي باحثة في مركز أبحاث مرض الزهايمر التابع لجامعة ويسكونسن ماديسون ولم تشارك في الدراسة غير اليريد الإلكتروني «للإنسولين دور في مساعدة خلايا المخ على تشكيل الروابط لذا يلعب دورا مياشرا في مساعدتنا على تكوين الذكريات.»

الباحثين في الدراسة وهو من جامعة تل أبيب في إسرائيل «هناك أدلة متزايدة على أن الإنسولين يؤدي وظائف عديدة في المخ لذا فقد يساهم ضعف تنظيم الإنسولين إلى تسريع وتيرة التدهور الإدراكي وربما يسبب مرض الزهايمر.» وأضاف عبر اليريد الإلكتروني «لا يقتصر الأمر على مرضي السكري من النوع الثاني، فحتى الأشخاص الذين يعانون مقاومة بسيطة للإنسولين وغير مصابين بالسكري من النوع الثاني يكونون في خطر أكبر بمرور الوقت.» وكان المشاركون في الدراسة عند بدايتها يبلغون من العمر 58 عاما في المتوسط وجميعهم مصابون بأحد أمراض القلب والأوعية الدموية. واستندت الدراسة المشاركون الذين أصيبوا بالسكري في البداية أو من أصيبوا بالمرض خلال فترة المتابعة. وأجرى البحث التقييمات المعرفية بمجرد بلوغ المشاركين نحو 72 عاما من العمر ثم مجددا عندما بلغوا نحو 77 عاما.

«رويترز» : خلصت دراسة حديثة إلى أن الحساسية المنخفضة للإنسولين قد تؤدي إلى تراجع سريع في الذاكرة ومهارات عقلية أخرى عند كبار السن حتى بين غير المصابين بمرض السكري. وصا يعرف بمقاومة الإنسولين أي عدم استجابة الجسم بشكل طبيعي لهرمون الإنسولين مؤثر على الإصابة بالسكري. ويصاب المرء بالسكري عندما لا يستطيع الجسم استغلال الإنسولين كما ينبغي لتحويل السكر في الدم إلى طاقة وربط العنم بالفعل بين مرض والتدهور الإدراكي والخرف لكن طبيعة هذه الصلة على وجه التحديد غير واضحة. ولإجراء الدراسة تتبع الباحثون 489 من كبار السن لأكثر من عقدين. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعلى مستويات لمقاومة الإنسولين سجلوا أسوأ أداء معرفي وأدنى نتائج في اختبارات الذاكرة ومهارة عقلية تعرف باسم الوظيفة التنفيذية. وقال دافيد تاني كبير

باحثون: العوامل المسببة للاكتئاب قد تختلف باختلاف العمر



«رويترز» : قال باحثون هولنديون إن المشاكل تختلف باختلاف العمر وبالتالي تتغير العوامل الشائعة وراء الإصابة بالاكتئاب بدورها عبر السنوات أيضا. وقال فريق قريب الدراسة في دورية (ذا أمريكان جورنال جيريباريتك سيكاتري) إن وجود عامل مخاطرة مثل التزل أو اعتلال الصحة في الشباب قد يكون له تأثير كبير في الإصابة بالمرض. وقالت روكسان شاكس كبيرة باحثة الدراسة في المركز الطبي في جامعة (في يو) في أمستردام «مجموعة مختلفة ومتنوعة من العوامل المسببة للاكتئاب تحدث على مدى الحياة... لكن من المتوقع أن ترتبط بقوة بعض العوامل المسببة للاكتئاب في مراحل عمرية بعينها وقد تؤثر في الحقيقة على مجموعات عمرية أخرى بدرجة أكبر.»

زادت لديهم احتمالات الإصابة بالاكتئاب أكثر ممن هم في فئات عمرية أخرى كان هذا السبب شائعا فيها. وعلى سبيل المثال فالإصابة بالأمراض المزمنة مرتبط بدرجة أكبر بالاكتئاب لدى الأصغر عمرا فيما جعل انخفاض الدخل خطرا أكبر بالإصابة بالمرض في كبار السن رغم شيوعه أكثر بين الأصغر عمرا. وقالت باتريشيا أريانا وهي أستاذ الطب النفسي وعلم السلوك في جامعة واشنطن في سياتل إن الشباب الذين يعانون من ظروف مثل المرض أو الوحدة تأتيهم تلك الظروف كمفاجأة وبالتالي قد لا يكون لديهم المهارات المطلوبة للتعامل معها.

وشددت على أهمية فحص الشباب المصابين بأمراض مزمنة لمعرفة إن كانوا مصابين بالاكتئاب. وأضافت أريانا التي لم تشارك في الدراسة «لحسن الحظ التدخل الوقائي لمنع الاكتئاب جيد أيضا للصحة العامة. الحصول على نوم جيد والراحة وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام والتواصل مع الأصدقاء والأسرة.» من جانبها قالت شاكس «على الأطباء والمعالجين النفسيين عدم تجاهل عوامل اكتئاب بعينها غير افتراض أنها أقل تأثيرا في مرحلة عمرية ما.»

بيانات لأكثر من ألفي بالغ شاركوا في دراستين طوليتي الأمد عن الاكتئاب والقلق. وتراوحت أعمار المشاركين في دراسة منهما بين 18 و 65 عاما عندما بدأوا المشاركة فيما تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة الأخرى بين 60 و 93 عاما عندما بدأوا المشاركة فيها. وبشكل أساسي كانت لدى 1432 مشاركا أعراض واضحة للاكتئاب فيما لم تكن لدى 784 مشاركا أي أعراض أو تاريخ سابق للإصابة بالاكتئاب. وتقيم فريق البحث تأثير 19

عاملا مسيما للاكتئاب على فئات عمرية مختلفة وقارنوا من لم يصابوا أبدا بالاكتئاب بمن يعانون منه. وتسببت أغلب العوامل محل البحث في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب في أي مرحلة عمرية ومن بين ذلك انخفاض مستوى التعليم والأحداث السلبية التي يمر بها الأشخاص والسمات الشخصية والميل إلى العزلة ونمط الحياة غير الصحي واعتلال الصحة. لكن خمسة عوامل بالذات كانت مرتبطة بدرجة أكبر بالاكتئاب في مراحل عمرية


عامة مسيما للاكتئاب على فئات عمرية مختلفة وقارنوا من لم يصابوا أبدا بالاكتئاب بمن يعانون منه. وتسببت أغلب العوامل محل البحث في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب في أي مرحلة عمرية ومن بين ذلك انخفاض مستوى التعليم والأحداث السلبية التي يمر بها الأشخاص والسمات الشخصية والميل إلى العزلة ونمط الحياة غير الصحي واعتلال الصحة. لكن خمسة عوامل بالذات كانت مرتبطة بدرجة أكبر بالاكتئاب في مراحل عمرية

النحفاء أقل عرضة للصداع النصفي



«إيلاف» : أكدت دراسة علمية حديثة أن النحفاء أقل عرضة لآلام الشقيقة والصداع النصفي. في مقال نشره موقع healthmagazine قال العلماء: «من المعروف أن السمنة سبب أساسي للعديد من الأمراض، وغالبا ما يصاب الذين يعانون من البدانة، من أمراض الأوعية الدموية، التي تسبب معظم آلام الصداع النصفي التي يصاب بها البشر.» وأشار العلماء إلى أن جميع الدراسات الطبية تؤكد أن 40% من المصابين بالبدانة يعانون من الشقيقة وآلام الصداع النصفي، وذلك لأن أوعيتهم الدموية لا تقوم بنقل الأوكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لتغذية الدماغ بشكل سليم، وأن أكثر المرضى الذين يتعرضون لتلك المشاكل هم من النساء، لأن جدران أوعيتهن الدموية أقل مرونة منها عند الرجال، وضغط الدم لديهم أقل بشكل عام.

احذر.. ألم الصدر مؤشر خطر يهدد القلب



وتراوحت أعمار المرضى بين 18 وأكثر من 75 عاما ونصفهم كانت أعمارهم أقل من 49 عاما. وقال فريق الدراسة في دورية (ذا بي.إم.جي) إن 72 بالمئة من المرضى لم يحدد أطباؤهم سبب ألم الصدر فيما حصل 23 بالمئة على تشخيص غير متعلق بأمراض القلب فيما شخص ألم الصدر في خمسة بالمئة بوصفه نبضة عسرية. وخضع أقل من 12 بالمئة من المرضى الذين عانوا من ألم غير معروف السبب في الصدر لفحوصات تشخيصية إضافية. وبعد فترة متابعة وصلت إلى خمس سنوات ونصف السنة كان احتمال إصابة المرضى الذين لم يحصلوا على تشخيص محدد لألم الصدر بازمنة قلبية أعلى بنسبة 36 بالمئة مقارنة بمن حصلوا على تشخيص لم يتعلق بأمراض القلب. وقال الدكتور تيم هولت وهو باحث في قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد كتب مقالة التعليق على الدراسة إن ألم الصدر هو عرض ربما يكون خطيرا وبالتالي على من يعانون منه معرفة السبب وإذا ترافق مع أعراض أخرى فلد تكون حالة طارئة تستوجب علاجاً دون تأخير.

بأمراض القلب. وأشار إلى أن خمسة أشخاص من بين مئة من المجموعة التي لم يكن سبب ألم الصدر فيها معروفا أصيبوا بمشكلات متعلقة بالقلب على مدى خمس سنوات تالية مقارنة بثلاثة أشخاص من كل مئة في المجموعة التي تحدد فيها أن سببها غير متعلق بأمراض القلب. وقال كروفوت إن المرضى يعانون من خطر أعلى على الرغم من ذلك لأن الدراسة خلصت أيضا إلى أن استشاروا أطباءهم بشأن ألم الصدر حصلوا على تقييم جيد بشكل عام بشأن ما هو الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. وأضاف «إذا قرر طبيب ممارس عام أن ألم الصدر لم يحدث بسبب علة في القلب لكن لأسباب أخرى مثل مشكلات في المعدة أو شد عضلي أو التهاب صدي فخطر الإصابة بمشكلات مستقبلية في القلب في تلك المجموعة أقل» على مدى خمس سنوات. وحلت الدراسة سجلات في قاعدة بيانات صحية إلكترونية في بريطانيا لأكثر من 170 ألف بالغ لم يكن لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بأمراض القلب وشكوا لأطباؤهم من ألم في الصدر للمرة الأولى بين عامي 2002 و 2009.

«العربية نت» : أشارت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا إلى أن أغلب من يشكون لألم الصدر لم يكن في الصدر للمرة الأولى لا يحصلون على فحوصات تشخيصية إضافية لتحديد سببها. ويقول الباحثون إن على الأطباء اعتبارها إشارة خطر وإسناد شوسس، حيث انحسرت معدلات وفيات الرضع 30 بالمئة على الأقل خلال فترة الدراسة. واستنادا إلى معدل التحسن في كل ولاية، خلصت الدراسة إلى أن 18 ولاية أميركية ستحقق المساواة في معدلات وفيات الرضع السود والبعض بحلول عام 2050. وذكرت الدراسة أن الأسباب الرئيسية لوفاة حديثي الولادة السود هي انخفاض وزن الرضيع عند الولادة والولادات المبكرة والعيوب الخلقية ومشاكل الحمل. وأضافت أن الأسباب الرئيسية لموت الرضع السود خلال عامهم الأول هي العيوب الخلقية ومتلازمة موت الرضع المفاجئ أو الإصابات العرضية. وقال سم هاربر وهو باحث في مجال الصحة العامة بجامعة مكجيل في مونتريال ولم يشارك في الدراسة إن الأمهات يمكنهن فعل الكثير للحد من وفيات الرضع مثل الرضص على الأكل الصحي والإقلاع عن التدخين والحصول على رعاية جيدة أثناء الحمل.

في هذه الدولة.. الرضع السود أكثر عرضة للوفاة



«العربية نت» : أشارت دراسة حديثة إلى أن الرضع السود أكثر عرضة بكثير للوفاة من أقرانهم البيض في بعض الولايات الأميركية على الرغم من تراجع معدلات وفاة الرضع على مستوى البلاد. وأضافت أن معدلات وفيات الرضع انخفضت حوالي 13 بالمئة في الولايات المتحدة من 2000 إلى 2013. لكن معدل وفاة الرضع السود بحلول نهاية هذه الفترة كان 11.1 وفاة بين كل ألف ولادة مقارنة بمعدل 5.1 وفاة بين كل ألف ولادة لرضع البيض. ويتم حساب المعدل وفقا لعدد الرضع الذين يتولفون قبل أن يتفوا عامهم الأول. وقدر الباحثون في دراستهم التي نشرت في دورية الأميركية للصحة العامة أن سد هذه الفجوة كان سيقت حياة قرابة 65 ألف رضيع أسود خلال فترة الدراسة. وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة جوينيكا براون سبيس من كلية الطب بجامعة ولاية فلوريدا عبر البريد الإلكتروني: «أود أن أشهد مساواة عرقية في بقاء الرضع على قيد الحياة خلال

التي شهدت أكبر تحسن في هذا الصدد هي أريزونا وأيووا وماساتشوستس، حيث انحصرت معدلات وفيات الرضع 30 بالمئة على الأقل خلال فترة الدراسة. واستنادا إلى معدل التحسن في كل ولاية، خلصت الدراسة إلى أن 18 ولاية أميركية ستحقق المساواة في معدلات وفيات الرضع السود والبعض بحلول عام 2050. وذكرت الدراسة أن الأسباب الرئيسية لوفاة حديثي الولادة السود هي انخفاض وزن الرضيع عند الولادة والولادات المبكرة والعيوب الخلقية ومشاكل الحمل. وأضافت أن الأسباب الرئيسية لموت الرضع السود خلال عامهم الأول هي العيوب الخلقية ومتلازمة موت الرضع المفاجئ أو الإصابات العرضية. وقال سم هاربر وهو باحث في مجال الصحة العامة بجامعة مكجيل في مونتريال ولم يشارك في الدراسة إن الأمهات يمكنهن فعل الكثير للحد من وفيات الرضع مثل الرضص على الأكل الصحي والإقلاع عن التدخين والحصول على رعاية جيدة أثناء الحمل.

وتحسنّت معدلات وفاة الرضع السود في كل الولايات خلال فترة إجراء الدراسة لكن لم تحقق أي منها المساواة. وكانت الولايات الثلاث

35 ولاية أميركية. وتراوحت معدلات وفاة الرضع السود بحلول نهاية الدراسة بين 6.65 إلى 13.77 وفاة في كل ألف ولادة.

حياتي وبعض الولايات تسير في الطريق الصحيح.» ولإجراء الدراسة استخدم الباحثون السجلات الحكومية لحساب معدلات وفاة الرضع في