


بدء الدراسة في الصباح الباكر يضر الصحة والاقتصاد



«سكاي نيوز» : كشفت دراسة حديثة، أن الاقتصاد الأميركي يتكبد خسائر مالية فادحة تصل إلى 9 مليارات دولار، بسبب بدء الدراسة داخل المؤسسات التعليمية في وقت مبكر من الصباح، كما تذهب إلى التساعات السلبية للتوقيت الحالي على تحصيل التلاميذ وصحتهم.

وبحسب دراسة أجرتها «رافائيل بوراويشن»، فإن من شأن بدء الدراسة بعد الثامنة والنصف، أن يوفر تلك المدارس التسعة، كما أن التغيير قد يساعد على تحسين التعليم وتقلدي عدد من حوادث السير وسط التلاميذ.

وأضافت أن تأخير ساعة الدراسة في الصباح، يوسعه أن يدر عائدات مالية مهمة، في حال جرى إقراره، ومن المرجح أن يرتفع عائدات البلاد الضريبية بـ 83 مليار دولار، في غضون عقد من الزمن.

وتنجم الخسائر المالية لبداية الدراسة مبكراً، عن تنقل التلاميذ صباحاً، في وقت الذروة، إلى مؤسساتهم التعليمية، فضلاً عن ما يتضمنه الازدحام من حوادث

كاميرا قادرة على رؤية أعضاء
الإنسان الداخلية



ويتمكن للأكامير ارصد مصدر الضوء من خلال 20 مستعملاً من الأنسجة، وقال البروفيسور. حكيم داليوال، من جامعة إدنبرة البريطانية، الذي شارك في تطوير الكاميرا، إن «لديها إمكانيات هائلة لتطبيقات متنوعة، مثل تلك الموصوفة في هذا العمل، فالقدرة على رؤية موقع الجهاز أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من التطبيقات في مجال الرعاية الصحية، ونحن نتحرك إلى الأمام باستخدام تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة».

روسي اليوم: طور علماء كاميرا يمكنها رؤية أعضاء الداخلية لجسم الإنسان، ما يساعد الأطباء على جراء الفحوصات بشكل أكثر فعالية. وبطريقة أسهل بدلًا من الاعتماد على الأشعة السينية المكلفة.

وتحل العصوب في هذا المرض،
وتحتفل العصبية عن طريق
اكتشاف عن مصادر الضوء داخل
جسم، عن خلال تتبع الأدوات
الطبية داخل جسم الإنسان
المعروفة باسم «المقطر»،
ذى يستخدم لإجراء مجموعة
من الفحوصات والإجراءات.

دراسة: قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها



وفقاً للمعلومات المطلوبة وحالته التي ينبغي أن يكون عليها من هم في مثل عمره. وقال دكتور مايك ثابتون من منظمة «بريتشر هارت فاونديشن» إن «اختبار عمر القلب هو وسيلة بسيطة وسريعة لتقدير عدد السنوات التي سيعيشها الإنسان في صحة جيدة». انش أي) على الانترنت لكل من تخطوا التلاذتين من أعمارهم ويطلب إجراؤه الإيجابية عن استلة حول مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم إضافة إلى استلة حول التاريخ الطبي والعادات المرتبطة بتعطّل حياة من يجري الاختبار.

قلب والجلطات». وأشار واترال في تصريحات لوكالة روس اسوسييشن إلى أن الاختبار «الكتروفي الذي اعتمد عليه الدراسة أن يعطي تقييماً فورياً لاحتمالات تعرض للجلطات وأمراض القلب ون الحاجة إلى زيارة طبيب»، والاختبار متاح على موقع (بي

«بي بي سي»: خلصت دراسة حديثة إلى أن قلب واحد من كل 10 رجال في بريطانيا أكبر من عمره الحقيقي. وجاء ذلك بعد اختبار أجري على 1.2 مليون متقطوع من الرجال والنساء ضمن حملة للصحة العامة في إنجلترا.

في الجلود.
وكشف الاختبار أن قلوب 11 بالمئة
من المقطوعين من الرجال في عمر
الخمسين أكبر بحوالي 10 أعوام من
اصحابها.

وأضافت الدراسة أن من لديهم «قلوب مسنة» مععرضون بشكل أكبر لخطر الجلطات والسكنات القلبية إضافة إلى خطر صحية آخرى مثل الذهان وأمراض الكلى والسكرى.

والدراسة أجرت بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا.


يذكر أن قرابة 7.400 شخص
يموتون شهرياً في بريطانيا جراء

الجلطات وأمراض القلب

وقال البروفيسور جيمي واترال المتخصص في الوقاية من امراض القلب والأوعية الدموية في «بابيليك هيلث انجلندا» (بما اتش اي) المشارك في الدراسة «يجب أن نسعى إلى أن تكون اعمار قلوبنا متساوية مع اعمارنا الحقيقة».

وأضاف «لا يجب الانتظار حتى تتقدم اعمارنا حتى نبدأ في تحبيب

كيف تعرف أنك مصاب بحساسية الحليب ومشتقاته؟




على عدم تحمل الطعام في الآلام البطن وتقلصات المعدة والانتفاخ والغثيان والدوار وخفقان القلب واحمرار الجلد وسيان الانف والتعب والصداع. وينبغي الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من الإصابة بعدم تحمل الطعام معنٍ ومعرفة كيفية تعديل النظام الغذائي من أجل تجنب المتابع. ويمكن لمريض عدم تحمل الطعام مواصلة تناول الطعام المسبيب للمتابع، ولكن بكمية معينة يحددها الطبيب، بخلاف مريض حساسية الطعام، الذي يتبعن عليه التخلّي تماماً عن هذا الطعام.

ذكرت مجلة "إيلي" الألمانية أن عدم تحمل الطعام يختلف عن حساسية الطعام في أن الأعراض تظهر بشكل أبطأ، أي بعد عدة ساعات من تناول طعام ما، وليس فور تناوله. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عدم تحمل الطعام يظهر بعد تناول الأطعمة المحتوية على اللاكتوز، كالحليب ومنتجاته، والجلوتين الموجود في معظم أنواع الحبوب خاصة القمح، والهيستامين، الذي يوجد في الطعام وفواكه البحر والجبن، الذي تستغرق عملية نضجه وقتاً طويلاً.

وتنتمي الأعراض الدالة

لماذا يجب تقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات؟



كلما زاد إفراز هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، ويعكس ذلك على السلوك العصبي، والظاهرة المعنوية، الإفراط في مشاهدة الشاشات يؤدي في النهاية إلى انخفاض الروح المعنوية، والشعور باليأس والإحباط. ويتبين هذا الشعور مع زيادة التواصل المباشر مع الأصدقاء، والتفاعل الاجتماعي، والمشاركة في الأنشطة.

توازن الهرمونات في الجسم، والتاثير على السلوكيات والانفعالات.

تدفق الدم. تزيد الرياضة والنشاط البدني تدفق الدم إلى تجاويف الدماغ والمناطق المسئولة عن التفكير الإبداعي، بينما تؤدي تضييق أوقيات طويولة أمام الشاشات إلى ضعف تدفق الدم إلى هذه المناطق.

النتيجة. كلما زادت التعرض للشاشات في ملاغب الرياضات المختلفة، ويتكمش التواصل الاجتماعي المباشر.

ـ 24: معظم الوقت الذي يقضيه الأطفال في مقاعد السيارة، أو في عمادة طبيب، يلعبون فيه باستخدام الهاتف، أما في البيت فيشغل الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون والألعاب الفيديو مساحة كبيرة من وقت اللعب والترفيه، وكثيراً ما يحيط ذلك على وقت استذكار الدروس أيام المدرسة، في مقابل تضياع أوقات اللعب الحر في الحدائق، واللعب المنظم