



إعداد : ياسر السيد

العدد 2265 – السنة الثامنة
الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2015
Monday 14 September 2015 - No.2265 - 8th Year

الثوم سلاح سري ضد ارتفاع ضغط الدم



سلاح سري لضغط الدم..
واكسدت ريس ان بحثها
يُعتبر الاول الذي يقيم تأثير
مستخلص الثوم طويل العمر،
مضيفة انه تم تقييم المستخلص
علاج اضافي لعلاقلر اخرى
في علاج ارتفاع ضغط الدم.
ويذكر ان الثوم مفيد للقلب
ويروج منذ قرون ممارسو طب
الايورفيدا التقليدي في الهند
منذ آلاف السنن لفوائد الثوم
على انه من المواد الواقية من
ارتفاع ضغط الدم.

العمر» سجلوا ضغط الدم
حوالي 10 مليمترات زئنيق الل
من مجموعة أخرى من المرضى
أعطيت علاجاً وحمياً.
وقالت ريد ان الثوم الذي يتم
تناوله بأي شكل سواء كان خاماً
او طازجاً او في شكل مسحوق
لم يكن له نفس التأثير.
وأضافت: «عند القيام بطهي
الثوم فإن المادة المسؤولة عن
خفض ضغط الدم تختفي،
اعتقد ان مستخلص الثوم
طويل العمر كمكمل غذائي هو

كشفت دراسة استرالية
نشرت في دورية ماتوريثاس
الجمعة 19-11-
2010، ان الثوم يعتبر سلاحاً
سرياً ضد ارتفاع ضغط الدم
وفي تجربة استغرقت 12
اسبوعاً وشملت 50 مريضاً،
اكتشفت الباحثة كارين ريد
وزملاؤها في جامعة اديلايد
بجنوب استراليا ان المرضى
الذين اخذوا 4 كيسولات
يومياً من مكمل يطلق عليه
«مستخلص الثوم طويل

■ دولنا تعتبر من البلدان التي تزداد فيها مخاطر المرض فيما يتعلق بالتلوث والسمنة والتدخين

فيها مخاطر السرطان فيما يتعلق
بالتلوث والسمنة والتدخين
وتسعي عن طريق المركز الخليجي
لمكافحة السرطان وبالتعاون
مع الاتحاد الخليجي للقيام
بحملة خليجية عامة للتوعية
سنتطلق في فبراير العام المقبل
حيث تم اختيار اول اسبوع من
فبراير ليكون اسبوع التوعية من
السرطان في دول مجلس التعاون
الخليجي



لوزراء الصحة واستعرض د.
الصالح خلال كلمته إنجازات
الانساء الذي تم إنشاؤه في
نوفمبر عام 2000وأهمها الجلسة
العلمية المحكمة التي صدرت عام
2007 والدليل الإرشادي الموحد
والمؤتمرات العلمية والتوعية وما
صدر من مئات الكتيبات التوعية
والزيارات الميدانية والبحوث
الخليج تعتبر من الدول التي تزداد

الدكتور خالد الصالح كلمة في
افتتاح المؤتمر أشار فيها الى
ان الوحدة الخليجية للجمعيات
والروابط الخليجية لمكافحة
السرطان بدأت من خمس عشر
عاماً وتوجت بالوحدة الحكومية
لدول مجلس التعاون بإنشاء
المركز الخليجي لمكافحة السرطان
تحت مظومة المكتب التنفيذي

■ الوحدة الخليجية للجمعيات والروابط لمحاربة السرطان بدأت من خمسة عشر عاماً

الافتحت أسس فعاليات المؤتمر
السادس للاتحاد الخليجي لمكافحة
السرطان في العاصمة العمانية
مسقط برعاية وحضور صاحب
السمو تيمور بن اسعد آل سعيد
وحضور وزير الصحة العماني
الدكتور احمد السعيد، والامين
العام للاتحاد الخليجي لمكافحة
السرطان الدكتور خالد الصالح
والقي الاسين العام للاتحاد
الخليجي لمكافحة السرطان

خبراء : المضادات الحيوية ضررها أكبر من نفعها



إن معرفة متى يجب أن تستخدم
أو نرفض تناول المضادات الحيوية
قد يساعد على منع ظهور وانتشار
أنواع قاتلة من البكتيريا
ويقول خبراء بمراكز منع
الامراض بأمريكا إن معرفة متى
تناول المضاد الحيوية ومتى
ترفضها قد يساعد في محاربة
انتشار أنواع من البكتيريا القاتلة.
فاكثر من نصف المضادات الحيوية
التي يصفها الأطباء للمرضى غير
ضرورية أو غير ملائمة، كما أن
الإكثار من هذه المضادات الحيوية
اسهم في خلق أنواع من البكتيريا
لا تستجيب للعقاقير التي توصف
لقتلها.

وتعلق د. لوري هيكس قائلة
إن المضاد الحيوية التي كانت
مورد علاج تحولت إلى مورد قليل
التأثير، لهذا ندعو د هيكس إلى
العمل على منع انتشار البكتيريا
للمقاومة للمضادات الحيوية.
ويعرب د. أرجون سرينغاسان،
مدير برامج منع العدوى، عن
قلقته من المخاطر الكبيرة للإفراط
في تناول المضادات الحيوية.
إذ إن كل أنواع البكتيريا تقريباً
أصبحت أكثر قوة وأقل استجابة
للعلاج بالمضادات الحيوية.
لهذا يبحث مركز منع الأمراض
الاسريكي على استخدام العقاقير
بالشكل الأمثل للمساعدة في تجنب
المشكلة العالمية الخاصة بمقاومة
المضاد الحيوية. ولتحقيق هذا
الهدف تتعاون إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية والعديد من الجمعيات
العلمية والطبية والإدارات الطبية
المحلية لتنفيذ مبادرة التعامل
بذكاء من المضادات الحيوية
التي أطلقها مركز منع الأمراض

المعدية التي تقاوم المضادات
الحوية مثل:

E.coli وهي سلالة جديدة من
البكتريا المعروفة بـ(ST131)
كونها سر المقاومة الخطيرة
للعقاقير وبعض الأمراض المعدية
بالولايات المتحدة عام 2007، إذا
ما اكتسبت هذه البكتيريا جيناً
آخر مقاوم للمضادات الحيوية فقد
تصبح أقوى من أي غلار.

• السل المقاوم للعقاقير. بينما
تجد الكثير من سلالات السل تقاوم
على الأقل احد أنواع المضادات
الحوية التي كانت تستخدم في
مقاومتها فإن سلالة –XDR
TB صارت مقاومة لكل أنواع
المضادات الحيوية التي تنتج في
العالم الآن.

وبينما تزداد مقاومة المضادات
الحوية تنكمش مستودعات

بأمريكا.

إن معظم سلالات البكتيريا
المقاومة للمضادات الحيوية
تنتشر في مراكز الرعاية الصحية
مثل المستشفيات ومراكز إقامة فرق
التدريب، إلا أن البكتيريا لمينة
مثل MRSA المعروفة ببكتيريا
المكورة العنقودية البرتقالية
والتي تسبب في مقتل نحو 19
الف أمريكي كل عام توجد بكثرة
في التجمعات الأخرى مثل النوادي
الصحية والمدارس وأماكن العمل.
كما تقول د هيكس بالإشارة إلى
تقارير حديثة عن التهاب الجيوب
الانفية التي تسببها بكتيريا تقول
هيكس إن الأشخاص الذين سوف
يعالجون بمضادات حيوية عن
طريق الفم سوف يحتاجون إلى
عقاقير أكثر سمية بل في بعض
الأحيان إلى دخول المستشفى
للعلاج. «وهذا ما رأيناه يحدث مع
التهاب الرئة وما يقلقني أن يحدث
هذا مع أمراض معدية أخرى.»
أراض معدية تقاوم المضادات
الحوية
وهناك العديد من الأمراض

عام، هناك ثلاثة علايين رطل فقط
تعطى كعلاج للأمراض، هذا ما دعا
إدارة الغذاء والدواء لأن توضع
المزارعين بالتوقف عن استخدام
المضادات الحيوية لتحسين نمو
الحيوانات والطيور.»

وللحفاظ على فاعلية المضادات
الحوية يوصي مركز منع
الأمراض بما يلي:

• تناول المضاد الحيوي الذي
يصفه لك الطبيب وإكمال الجرعة
إلى نهايتها حتى لو بدأت تشعر
بالتحسن، بهذه الطريقة لن تتمكن
البكتيريا من البقاء للعدو لتصيبك
بمرض مرة أخرى،
• نخلص من أي كمية متبقية
من المضاد الحيوي،
• لا تطلب من طبيبك أن يصف
لك مضاداً حيوياً عندما تعاني
من نزلات البرد والإنفلونزا لأنها
أمراض تسببها الفيروسات، لهذا
لا تلقي المضادات الحيوية في
علاجها.

• إذا ما أصبت بمشاكل بالحلق
عليك بعمل تحليل للأنفك من أن
التهاب الحلق ناتج عن الإصابة
بعدوى بكتيرية أو لا قبل تناول
أي مضاد حيوي.

• لا تتناول مضاداً حيوياً وُصف
لشخص آخر، فتناول العلاج
الخطأ قد يؤخر العلاج ويسمح
للبكتيريا بالنكاث.

• إذا ما أصيب طفلك بعدوى في
الأنف فتابع حالته وانتظر، فهذه
هي أفضل طريقة لعلاج عدوي
الأنف عند الأطفال والتي غالباً
ما تنتج عن الإصابة بفيروس،
كما أكدت دراسة حديثة نشرت
أخيراً بجمعية الجمعية الطبية
الأمريكية.

المضادات الحيوية. إذ لم تعتمد
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
سوى 10 أنواع جديدة من
المضادات الحيوية منذ عام 1998.
لهذا يرى د. سريغاسان أنه من
الأهمية بمكان أن تطور أنواعا
جديدة من المضادات الحيوية
بينما نقوم بترشيد استخدامها
للمضادات الحيوية الحالية.

ويحدد د. فليب تيرنر (مدير
طب المناعة بجامعة نيويورك)
سببين أساسيين لمقاومة المضادات
الحوية: الأول هو استخدامه
بكثرة: «حوالي ستة مليارات
روشتة بكتيها الأطباء لمرضايع
كل عام بأمريكا نصفها تقريباً
تنضمن مضادات حيوية، ويعتقد
مركز منع الأمراض أن نصف تلك
الوصفات – التي تصف مضادات
حوية – غير ملائمة»، السبب

مرض بالإنفلونزا. ولا يجب على الأطفال
بالشاركة في استخدام الماصة أو أدوات
الطعام والشراب أو المناشف أو فرشاة
الأسنان مع شخص مصاب، ويجب غسل
الأطباق والمفاتيح بماء ساخن وصابون أو
بمغسلة أطباق، واستبدال المناشف وغسلها
بالماء الساخن.

يُذكر أن الفيروسات تعيش لأكثر من
30 دقيقة على مقابض الأبواب وصنادير
الحمامات واسطح العملات بل ولعب الأطفال،
فيجب تنظيف كل الأسطح بالمطهرات،
ويُنصح بإبعاد الأطفال خاصة الصغار
منهم عن مصادر التدخين، لأن الأطفال الذين
يتعرضون لدخان السجائر تزيد لديهم
مخاطر الإصابة بأمراض التنفس.
ومن المعروف أن الإنفلونزا هي مرض معد
يصيب الأنف والحلق والربتين وينتج عن
سلالات متنوعة من الفيروسات، وأفضل
طرق الحماية منها هو التطعيم.

علماء : استخدام الأدوية المسكنة أثناء الحمل يؤثر على الخصوبة إن كان الجنين ذكراً



وجد علماء من الدنمارك وفنلندا وقزسا أن
استخدام الأدوية المسكنة للأوجاع الخفيفة مثل
«الباراسيتامول» خلال الحمل قد يكون السبب
الأهم وراء ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز
التناسلي لدى المواليد من الذكور.

وأضافوا أن النساء اللواتي عن يستخدمن
أدوية مثل «اي بروفين» و«إسبيرين» زاد عندهن
سبع مرات خطر إيجاب طفل ذكر يعاني من أحد
أمراض الجهاز التناسلي، وهو ما يؤلر على
خصوبته لاحقاً.
وجرب العلماء تلك المسكنات على الفئران
ولاحظوا أنها تحد من إنتاج الهرمون الذكري

«تستوستيرون»، ويثبت الدراسة أن حبة واحدة
من «الباراسيتامول» من عيار 500 ملغرام تعرقل
إنتاج الهرمون الذكري بقدر ما يعرقله تعرض
الأم لعشرة أنواع من الملوثات الكيميائية طوال
فترة الحمل.
وتأثير تلك المسكنات في الفصل الثاني من
الحمل تعتبر الأكثر قلقاً، فاستخدام أي مسكن
النساء تلك الفترة يضاعف الخطر. وتبين أن
تأثير «اي بروفين» و«إسبيرين» أقوى من تأثير
«الباراسيتامول»، واستخدام أكثر من نوع واحد
من المسكنات في نفس الوقت يرفع الخطر 16
مرة.

باحثون : المشي السريع 30 دقيقة يجنبك عشرات الأمراض

فمن خلال هذه العادة يظل الشخص خضر
إصابته بأمراض القلب والجذطات ومرض
الخرف وترقق العظام والسكري من النوع
الثاني والتهابة والسمنة المفرطة.
وربط الباحثون المشي السريع يومياً
بالتقليل من خطر السرطان خصوصاً
سرطان القولون وسرطان لإبطاء مفعول
الرجال، كما أكدوا أن المشي يسهم في تجاوز
المصاب بالسرطان مع العلاج.

أفاد باحثون بان المشي السريع لمدة 30
دقيقة يومياً كافية للتقليل من خطر عشرات
الأمراض كالخرف والسرطان
واعتمدت الدراسة على نتائج 40 دراسة
أجريت على مدى الأربع سنوات الأخيرة،
ويدعو فيها الباحثون إلى تخصيص
150دقيقة أسبوعياً للمشي لإبطاء مفعول
التقدم في السن الذي يُضعف الاعضاء
ووقلائفها.

